


**ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ sujet n° 2**

**EXERCICE 4 7 points**

**Thèmes : géométrie dans le plan et dans l'espace**

On considère le cube ABCDEFGH d'arête de longueur 1.

L'espace est muni du repère orthonormé  $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ . Le point I est le milieu du segment [EF], K le centre du carré ADHE et O le milieu du segment [AG].



*Le but de l'exercice est de calculer de deux manières différentes, la distance du point B au plan (AIG).*

**Partie 1. Première méthode**

1. Donner, sans justification, les coordonnées des points A, B, et G.  
On admet que les points I et K ont pour coordonnées  $I\left(\frac{1}{2}; 0; 1\right)$  et  $K\left(0; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ .
2. Démontrer que la droite (BK) est orthogonale au plan (AIG).
3. Vérifier qu'une équation cartésienne du plan (AIG) est :  $2x - y - z = 0$ .
4. Donner une représentation paramétrique de la droite (BK).
5. En déduire que le projeté orthogonal L du point B sur le plan (AIG) a pour coordonnées  $L\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .
6. Déterminer la distance du point B au plan (AIG).

**Partie 2. Deuxième méthode**

*On rappelle que le volume V d'une pyramide est donné par la formule  $V = \frac{1}{3} \times b \times h$ , où b est l'aire d'une base et h la hauteur associée à cette base.*

1. **a.** Justifier que dans le tétraèdre ABIG, [GF] est la hauteur relative à la base AIB.  
**b.** En déduire le volume du tétraèdre ABIG.
2. On admet que  $AI = IG = \frac{\sqrt{5}}{2}$  et que  $AG = \sqrt{3}$ .  
Démontrer que l'aire du triangle isocèle AIG est égale à  $\frac{\sqrt{6}}{4}$  unité d'aire.
3. En déduire la distance du point B au plan (AIG).